





| | | |
|--|--|--|
| ГАУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №4 г.Уфа | Стандартная операционная процедура | СОП -03-2020 Первая редакция Лист 1 из 3 |
| | Алгоритм надевания и снятия защитного костюма и средств индивидуальной защиты | |
| | Введен в действие: 03.2020г. | |

| | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
|--------------|---|----------------|---|------|
| Утверждено: | Главный врач | Г.Ш.Зубаирова |  | |
| Разработала: | Главная медсестра | А.Х.Васильева |  | |
| Согласовано: | Заместитель главного врача по медицинской части | Г.Ф.Уразметова |  | |



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| | |
|----------------------------------|---|
| Цель | Обеспечить соблюдение в медицинской организации противоэпидемиологической безопасности по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
| Функциональное назначение | Профилактическое |
| Материальные ресурсы | ИМН: Бак, мешки класса В, ёмкости, защитный костюм, маска, респиратор, защитные очки, перчатки, бахилы высокие, лейкопластырь, бинты нестерильные 7*14 см. Дезинфицирующий раствор для дезинфекции отходов Класса Б Прочий расходный материал: салфетки марлевые однократного применения. |

Информация о распространении:

| Номер копии | Держатель копии |
|-------------|---|
| 1 | ЛПО1-главная медицинская сестра |
| 2 | ЛПО1-заведующий ЛПО1;заведующий ортопедическим отделением |
| 3 | ЛПО2- заведующая отделением;старшая медицинская сестра |

1. Назначение: Обеспечить соблюдение в медицинской организации противоэпидемиологической безопасности по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19

2. Ответственность: Исполнителями являются: 1) врач;
2) медицинская сестра.

Контроль возлагается на заведующих отделениями.

3. Область применения: Данная процедура подлежит исполнению в кабинетах (бокс) ГАУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 4 г.Уфа оборудованных по стандарту оснащения .

4. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Методические указания 3.1.3260-15 « Противоэпидемическое обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании очагов опасных инфекционных заболеваний» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека , Главным государственным санитарным врачом РФ 24 марта 2015 г.)

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| ГАУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №4 г.Уфа | Стандартная операционная процедура | СОП -03-2020 Первая редакция |
| | | Лист 1 из 3 |
| | Алгоритм надевания и снятия защитного костюма и средств индивидуальной защиты | |
| Введен в действие: 03.2020г. | | |

4.2.Приказ МЗ РФ № 198-Н от 19 марта 2020 г. « О временном порядке организации работы медицинских организациях в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» .

4.3.СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

| Шаг | Действия | Ответственный |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| 1.Подготовка к процедуре | 1.1.До начала оказания медицинской помощи пациенту выдать респиратор, если пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию пришел без средств индивидуальной защиты. Защитный костюм и СИЗ надевается в кабинете (боксе) по месту оказания медицинской помощи. | Врач, медицинская сестра |
| | 1.2.Обработать руки спиртосодержащим антисептиком, просушить. | |
| | 1.3.Надеть перчатки. | |
| | 1.4.Взять в руки комбинезон,надеть брюки. | |
| | 1.5.Надеть рукава комбинезона по очереди. | |
| | 1.6. Надеть бахилы, заправив под них брюки комбинезона, закрепить бахилы завязками. | |
| | 1.7. Взять респиратор в ладонь и раскрыть до чашеобразной формы. | |
| | 1.8.Наклонив голову вперед нижнюю резинку протянуть через голову зафиксировать на затылке, одновременно прикладывая нижнюю часть респиратора к подбородку, а верхнюю часть к переносице. | |
| | 1.9.Протянуть верхнюю резинку респиратора через голову и зафиксировать ее ниже затылка. Прижать носовой зажим к носу.Сделать вдох и выдох. Убедиться ,что нет доступа воздуха, отрегулировать положение респиратора. Проверить их прилегание. | |
| | 1.10. Очки обработать пеной для бритья, одеть респиратор наклонив голову вперед. Резинку затягиваем ,чтобы очки сели плотно. Плотно затомпонировать оставшиеся зазоры. | |
| | 1.11.Надеть капюшон | |

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| ГАУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №4 г.Уфа | Стандартная операционная процедура | СОП -03-2020 Первая редакция |
| | | Лист 1 из 3 |
| | Алгоритм надевания и снятия защитного костюма и средств индивидуальной защиты | |
| Введен в действие: 03.2020г. | | |

| Шаг | Действия | Ответственный |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| | 1.12.Застегнуть комбинезон | |
| | 1.13.Надеть вторую пару перчаток, заправив под них рукава комбинезона | |
| | 1.14.Убедиться в том, что элементы защитного комплекта надеты правильно: исключены непокрытые кожные покровы, отсутствуют зазоры между элементами. Убедиться в удобстве работы в костюме в течении всей манипуляции.. | |
| 2. Выполнение процедуры | 2.1.Оказать медицинскую помощь больному. | Врач,медицинская сестра |
| 3. Окончание процедуры | 3.1.Снимать костюм только после заключительной дезинфекции кабинета (бокс), где оказывалась медицинская помощь. После каждого этапа снятия защитного костюма проводить дезинфекцию рук в перчатках. | Врач,медицинская сестра |
| | 3.2.Помыть руки в перчатках в дезинфицирующем растворе, снять верхние перчатки и скинуть в емкость класса В. | |
| | 3.3. В течении 1-2 х минут тщательно помыть руки в перчатках в дезинфицирующем растворе. | |
| | 3.4.Развязать завязки на бахилах. Обработать руки в перчатках. | |
| | 3.5.Медленно расстегнуть текстильную застежку на комбинезоне, снять копушон выворачивая его наружу ,не соприкасаясь с внешней стороной защитного костюма. | |
| | 3.6.Снять комбинезон так ,чтобы изнаночная сторона была снаружи, снять штаны комбинезона с бахилами и погрузить в емкость класса В , не расправляя. | |
| | 3.7.Наклонив голову вперед снять защитные очки , оттягивая двумя руками вперед, вверх и в сторону. Погрузить в дезинфицирующий раствор. | |
| | 3.8.Наклонив голову вперед снять респиратор , оттягивая двумя руками вперед, вверх и в сторону. Погрузить в дезинфицирующий раствор. | |
| | 3.7.Снять перчатки в дезинфицирующем | |

